MANUAL ILUSTRADO DE ENFERMERÍA FUNDAMENTAL - CLASA

Cómo acceder al contenido digital exclusivo de la Obra:

- 1. Ingresar en: www.clasadigital.com
- 2. Hacer clic en el ícono de la Obra:



3. Para acceder a la página, se debe ingresar el número de **ISBN** de la Obra. Este se encuentra en la página del *Staff* o junto con la *Catalogación en la fuente*. Consiste en un código de 13 números separados por guiones. Es necesario escribirlo completo, incluyendo los guiones, para lograr un acceso exitoso.



4. Para realizar consultas en el Vademécum, se puede seleccionar por principio activo o ingresar el término deseado en el buscador:



5. Los principios activos están ordenados alfabéticamente.

C	Principios a	activos	Indice fa	rmacológio	io									٩	
	Índice	de p	rincip	ios ac	tivos										
#	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L	Μ	Ν	
	Filtro														
	ABACAVI	R													
	ABACAVI	R + LAMI	VUDINA											-	
	+ ABACAVIR + LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA							-							
	ABATACE	EPT												-	
	ABCIXIM	AB													
	ABIRATERONA														
	ACAMPR	OSATO													
	+ ACARBOSA														
	ACEBRO	FILINA													
	ACECLO	ENACO													
	ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO														
	ACEITE E	E RICINC)												

6. A través del buscador, se puede consultar el término deseado. Los resultados aparecen en una lista, que incluye el término solo y las posibles combinaciones con otros fármacos:

 Principios activos 	Indice farmacológico	
Resultados de	la búsqueda	
azitromici	na	
Resultados por página	20 💽 Mostrar resultados que contengan 🧿 cualquier palabra 🔿 todas las palabras	
Resultados de la búsq	ueda: azitromicina	
9 resultados encontra	dos	
1. AZITROMICINA		
AZITROMICINA Código ATC J01F A amigdalitis, faringitis, Actualizado: Abril 06 de 20	IO-S01A A26 indicaciones infecciones de piel y tejdos blandos: celulitis, erispela, foliculitis, infecciones del tracto respiratorio superior: sinualitis, infecciones del tracto respiratorio inferior: bronquitis, neumonia. Utetritis por Chlamydia o Netseria gonorrhoese. 15	
Z. MICH HOMICINA AZITROMICINA + NIM Código ATC J01F A Producidas entre otro: Antualizado Acosto 05 de	En MINESOLIDA ESULIDA Indicaciones Infecciones del aparato respiratorio superior e inferior, incluidas otitis media, sinustis, faringoamigdalitis, bronquitis y neumo por S. proeumoniae, H. Influenzae y parainfluenzae, B. catarrhalis. La aztromicina es generalmente eficaz en la erra 2015.	nía.
3. TINIDAZOL + AZITROI TINIDAZOL + AZITROI Código ATC G01A A trachomatis, Haemopi Actualizado: Enero 20 de 3	ISCHELENT + FLUCONAZOL MCRN + FLUCONAZOL Indicaciones Indicado tanta en el hombre como en la mujer en las infeccines genitales no complicadas, causadas por Candida spp, Chlan indus ducrey, Neisseria gonorrhoeae, Trichomona vaginalis, Tregonema pallidum, Gardnerella vaginalis tots	nydia
4. CLORFENAMIN		
Código ATC RD6A B congestión nasal Actualizado: Agosto 31 de	A MALEATO (CLORFENIRAMINA) + PSEUDOEFEDRINA + CODEÍNA EATO (CLORFENIRAMINA) - PSEUDOEFEDRINA + CODEÍNA 51 indicaciones Tratamiento sintomático de la tos no productiva, de origen alérgico, infrativo, asociada a bronquitis y/o restrio, además do 2016	

7. Cada resultado brinda información sobre las indicaciones y contraindicaciones de los fármacos, las precauciones de uso, posibles reacciones adversas y su forma de dosificación:

Principios activos	Indice farmacológico	0
AZITROMI	CINA	
Código ATC J01F A10	- S01A A26	
Indicaciones		
Infecciones de piel y te respiratorio inferior: br Tratamiento tópico de trachomatis.	sjidos blandos: celulitis, erisipela, foliculitis. Infecciones del tracto respiratorio superior: amigdalitis, faringitis, sinusitis. Infecciones del tracto onquitis, neumonía. Uretritis por Chlamydia o Neissenia gonorrhoeae. Ia conjuntivitis infecciosa causada por cepas sensibles: conjuntivitis bacteriana purulenta y conjuntivitis tracomatosa causada por Chlamyd	ia
Contraindicaci	ones	
Pacientes alérgicos a	azitromicina u otros antibióticos macrólidos. Embarazo, lactancia y niños menores de 6 meses.	
Precauciones		
El tratamiento debe se exantemáticas extens recomienda tomar el a	r suspendido inmediatamente, en el caso de que el paciente experimente algún episodio de diarrea y/o dolor de cabeza intenso, y eupcione as. Debe realizarse un estructo control clínico en ancianos. En pacientes con insuficiento hapática puede ser prestos reducir la dosis. Se mitóbrico por vía conte anyunas (unb hara antes do ab horas después de cualquier comida).	s
Reacciones ad	versas	
Los efectos más cara cabeza, mareos. Rara	cterísticos son: ocasionalmente diarrea, náusea, dolor abdominal, incremento de los valores de transaminasas, leucopenia, neutropenia, dolo mente: erupciones en la piel, comezón.	r de
Dosificación		
La dosis debe darse a Tratamiento de infecc consecutivos. Tratamiento de las en	l menos 1 hora antes o 2 horas después de la comida. ones de las vas respiratorias (altas y bajas) y de la piel La dosis usual es de 500 mg/día en una administración única, durante 3 días fermedades de transmisión sexual causadas por cepas sensibles de Chlamydía trachomatis o Neisseria gonorrhoese 1 g administrado com	0
dosis única. Dosis pediátrica: Se re Niños de más de 45 k SOLUCIÓN OFTÁLMIC	comienda una dosis diaria de 10 mg/kg en una sola toma durante 3 días (dosis total tratamiento: 30 mg/kg), de peso: Dosificación como en adaltos. No sobrepasar 500 mg al día. A	
Instilar 1 gota en el fór bacteriana purulenta e Niños de 1-2 años: No	nix conjuntival, 2 veces al dia, durante 3 dias. No se dispone de suficiente experiencia con este medicamento para el tratamiento de la conju n miños menores de 2 años. se requiere un ajuste de dosis para el tratamiento de la conjuntivitis tracomatosa.	ntiviti
Niños menores de 1 a	ño: No hay suficiente experiencia.	

8. También están separados en diversas categorías en el Índice ATC farmacológico:

Índice ATC farmacológico

Seleccione abajo el grupo farmacológico del cual quiere consultar sustancias

- Selectione abajo el grupo farmacológico del cual quiere consultar sustancias.

 Seleccione Grupo Farmacológico Seleccione Grupo Farmacológico Belcacione Grupo Farmacológico C. SISTEMA DICESTIVO Y METABOLISMO
 B. SANGREY Ó RGANOS FORMADORES DE SANGRE
 C. SISTEMA CARDIOVASCULAR
 D. MEDICAMENTOS DERNATOLÓGICOS
 G. SISTEMA CARDIOVASCULAR
 J. ANTINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO
 L. AGENTES ANTINEPCENSICOS E INMUNOMODULADORES
 M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
 N. SISTEMA MERVIOSO
 F. PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
 R. SISTEMA RESPIRATORIO
 S. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
 V. VARIOS

9. Seleccionando una categoría, se accede a un listado de fármacos ordenados de acuerdo con su uso en terapias específicas. El símbolo [+] significa que hay varios ítems incluidos en la categoría.

Índice ATC farn	nacológico
Seleccione abajo el grupo fan	macológico del cual quiere consultar sustancias.
C - SISTEMA CARDIC	DVASCULAR
· C - SISTEMA CARDIOVA	SCULAR *
[+] C01 - Terapia cardíaca	
C01A - Glucósidos cardi	2003*
[+] CO1A A - Glucósidos d	ligitálicos
DIGOXINA	
METILDIGOXINA	
CO1A B - Glucósidos de l	a escila *
C01A C - Glucósidos del	estrofanto *
C01A X - Otros glucósido	os cardíacos *
C01B - Antiarrítmicos de	clase Ly III *
[+] C01B A - Antiarrítmico	s de clase IA
[+] C01B B - Antiarrítmico	s de clase IB
[+] C01B C - Antiarritmico	is de clase IC
[+] C01B D - Antiarritmico	is de clase III
[+] C01B G - Otros antiam	itmicos de clase I
C01C - Estimulantes can	rliacos excl. olucósidos cardíacos *

10. Al hacer clic en los ítems, se accede a la información completa del fármaco.

